

УДК 595.42

Эритрейды (Acariformes: Actinedida: Erythraeidae)

Асланов О.Х.¹, Ализаде Г.А.²
¹Институт Зоологии НАНА, ²АГПУ

В статье дается обзор клещей семейства Erythraeidae Robineau-Desvoidy, 1828.

Приведены сведения о морфологии, биологии, экологии, практическом значении этих клещей.

Тело овальное или яйцевидное, спереди несколько расширенное, покрыто многочисленными щетинками. Длина 0,5-3 мм, цвет обычно красный, но могут быть и других цветов, например, бурого, вишневого, свинцово-синего. Часто тело окрашено пятнами разных цветов. Гипостом крупный, треугольный. Хелицеры длинные, стилетовидные, способны втягиваться в туловище. Педипальпы крупные, не втягивающиеся. Голень педипалпы массивная, с крупным коготком нависающим над лапкой. Редко голень и ее коготь тонкие, слабые. У представителей некоторых родов (напр., Erythraeus) на педипальпах имеются шиповидные щетинки (conale). Имеется одна или 2 пары линзовидных глаз. Проподосома отделена от гистеросомы неглубокой бороздкой. Посреди проподосомы располагается узкий проподосомальный щиток-лобный киль (*Crista motopica*), который может доходить до середины идиосомы. Обычно он связан с двумя сенсорными полями, каждое из которых несет пару сенсилл. У имаго клещей рода *Kakamasia* Lawrence, 1944 имеется хорошо развитый дорсальный щит, покрывающий всю дорсальную поверхность идиосомы. У имаго клещей родов *Neosmaris* Hirst, 1926, *Neobalaustium* Willmann, 1951 и у палеарктических видов рода *Balaustium* v. Heyden, 1826 лобный киль редуцирован. У представителей рода *Microsmaris* Hirst, 1926 лобный киль редуцирован или отсутствует. У клещей рода *Wartookia* Southcott, 1961 лобный киль отсутствует. У клещей подсемейства *Balaustiinae* Grandjean, 1947, кроме обычных сенсилл, на теле имеется 1-2 пары чашевидных сенсорных органов, называемых урнулами. Их функция неизвестна. У представителей р. *Neobalaustium* Willmann, 1951 на дорсальной стороне проподосомы имеется треугольное возвышение, называемое перискутумом и урнулы располагаются в его постеролатеральных углах. Редуцированный лобный киль и сенсорные поля

расположены на узком и длинном проподосомальном щите, окруженно перискутумом.

Ноги длинные, бегательные, шестичлениковые. Нередко отдельные членики ног бедро, голень или лапка) сильно утолщены или украшены султаном крупных длинных щетинок (род *Eatoniana* Cambridge, 1897). Лапки окружены паром коготков. Половые присоски отсутствуют. Перитремы у имаго расположены дорсально на ротовом конусе, продольные. У самцов половое и анальное отверстия слиты, а у самок удалены друг от друга.

Гетероморфные личинки эритреид имеют 3 пары ходильных ног. Имеется проподосомальный щит, несущий 2 пары сенсилл и 2-3 пары тактильных щетинок (скутале). У гомеоморфных личинок подсемейства *Balaustiinae* имеется лобный киль. Дорсальный щит, если имеется, длинный и узкий, неотчетливый. В этом случае лобный киль располагается на дорсальном щите.

У личинок *Leptus clethrionomydis* Haitlinger, 1987 передняя пара сенсилл отсутствует. У личинок-эритреид наружное генитальное и анальное отверстия отсутствуют. Уростигм нет. Тазики ног у личинок всегда отделены друг от друга. Трихоботрии на ногах личинок отсутствуют. Латеральные тарсальные коготки на ногах личинок (т.е. неолатеральные ножные коготки) обычно неодинаковые (1,4,5,12,20)

Эритреиды имеют сложный жизненный цикл, состоящий из следующих стадий: яйцо-неподвижная предличинка (дейтовум)- личинка –нимфохризалис (куколка I)-дейтонимфа-имагохризалис (куколка II)- имаго-самец или самка). Имеются брачные танцы. Размножение –сперматофорные.

У яиц *Erythraeus phalangoides*, дейтонимф *E.nivalis* и предрепродуктивных имаго *E.sp.* имеется обязательная зимняя пауза (23). Имаго и дейтонимфы эритроидных клещей хищники, поедающие мелких членистоногих. Однако клещ *Balaustium murorum* (Hermann, 1804) имеет очень широкий спектр питания. Помимо насекомых он питается пылью и тканями листьев. При укусе и при случайном контакте он может вызывать у людей дерматиты (жгучие папулы, экзема, кровоподтеки).

У клещей р. *Balaustium* и вероятно, большинства других *Balaustiinae*, все активные стадии-хищники или поедатели пыли.

Личинки эритреид как правило эктопаразиты. Они отыскивают свободноживущих беспозвоночных, прикрепляются к ним, прокалывают хелицерами кутикулу хозяина и поглощают гемолимфу и тканевые жидкости посредством трубковидного стилостома или без него. Стилостом действует как белковая соломинка для питья. Напи-

тавшиеся личинки спадают с хозяина и превращаются в восьминогих дейтонимф, являющих свободноживущими хищниками. Личинки некоторых видов р. *Abrolophus* Berlese, 1891, например, *Abrolophus longicollis*, свободноживущие хищники.

Личинки эритреид могут встречаться не только на членистоногих, но и на позвоночных. Так на о. Бугенвиль с ящерицы была снята личинка клеща р. *Leptus*. *Leptus clethrionomydis* Haitlinger, 1987 описана по личинке, снятой в Польше с европейской рыжей полевки, *Charletonia cardinalis* (C.L.Koch, 1837) была найдена в Польше на горностае, *Balaustium wratislaviensis* Haitlinger, 1996 найден на синицах. Наконец, на европейской рыжей полевке были найдены личинки *Leptus phalangii* (De Geer, 1778) и *L.ignotus* (Oudemans, 1903). Личинки эритреид встречаются также на растениях, на поверхности почвы, в древесной трухе, в пшенице. Личинки эритреид являются переносчиками возбудителей различных болезней беспозвоночных (4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23).

Эритреиды-каннибалы (4)

Иногда дейтонимфы эритреид форезируют на мелких грызунах (10). Так в Польше 2 дейтонимфы *Erythraeus dubiosus* Schweizer, 1951 были коллекционированы с *Microtus arvalis* (Pallas), а 1 нимфа *E.regalis* (C.L.Koch,1937) с *Clethrionomys glareolus* (Schreb).

Эритреиды приспособились к засушливым условиям окружающей среды. Многие эритреиды найдены в засушливых биотопах, но ряд видов вторично заселили влажные местообитания (напр., некоторые *Callidosoma*, *Charletonia singularis*) или супралитораль или верхнюю границу эулиторали и скалистые берега эстуариев, напр., виды р. *Abrolophus* (22).

Эритреиды имеют большое практическое значение как регуляторы численности сосущих вредителей. Так клещи рода *Abrolophus* - эффективные регуляторы численности сосущих вредителей в низкогорных дубовых лесах Хызынского района, на люцерновых полях Шамкирского района и в приусадебных виноградниках Исмаил-лынского района (с. Ивановка). *Balaustium murorum* (Hermann, 1804).- эффективный хищник клеща *Halotydeus destructor* (сем. *Penthaleidae*). *Balaustium putmani* Smiley, 1968 регулирует численность сосущих вредителей в плодовых садах Канады (2, 16, 18). Личинки некоторых видов р. *Leptus* Latreille, 1776, например, *Leptus* sp. из с. Еникенд Агсуинского района, *Leptus ariel* Southcott, 1989 из Гватемалы паразитируют на медоносной пчеле (3, 21). Эритреиды известны с мела

(меловой янтарь, Канада, личинка на мелком двукрылом из подотряда *Nematocera*).

В настоящее время известно около 800 видов эритреид (24).

Литература

1. Асланов О.Х., 1996. Подотряд Trombidiformes.-В книге: Животный мир Азербайджана. Том 2. Членистоногие. Баку, «Элм», 1996, с. 68-77.
2. Асланов О.Х., 2008, К изучению хищных актинидных клещей (Acariformes, Actinedida) виноградников Азербайджана. –Труды общества зоологов Азербайджана. Т.1, 2008, с. 210-216.
3. Асланов О.Х., Рубцова Л.Е., Ханбекова Е.М., 2015. Клещи, ассоциированные с медоносной пчелой *Apis mellifera* саус.Gorb. в Азербайджане. –Труды общества зоологов Азербайджана. Т.7, 2015, с. 119-126.
4. Э.Бэкер и Г.Уартон, 1955. Введение в акарологию. –Издательство иностранной литературы, Москва, с. 248-253.
5. Б.А.Вайнштейн, 1978. Семейство Erythraeidae.-В книге: Определитель обитающих в почве клещей. Trombidiformes.-Москва, «Наука», с. 214-217
6. [Http://www/faunarb.info/animals/Semeystvoerythraeidae](http://www/faunarb.info/animals/Semeystvoerythraeidae).
7. Abro A., 1988.The mode of attachment of mite larvae (*Leptus* spp.) to harvestmen (Opiliones). Journal of Natural History 22.123-130
8. Lese Bartsch et al., 2006. Süßwasserfauna von Mitteleuropa:Chelicerata Araneae, Acari. Band 7.2.1:69-73
9. L.S.Fuentes-Quintero et al., 2014. A redescription of *Balaustium leanderi* Comb. nov, (Actinotrichida, Erythraeidae) with First Report on Characteristics of All Active Instars and Taxonomic Notes on the Genus-Florida Entomologist, 97 (3):937-951
10. G.Gabrys and R.Haitlinger, 1986. New and rare mites (Acari: Calyptostomidae, Erythraeidae, Trombidiidae) for the fauna of Poland. Pol. Pismo Entomol., tom 56:471-474
11. R.Haitlinger, 1985. *Charletonia singularis* (Oudemans, 1910) i inne rzadkie roztocze (Acarina) zebrane na ssakach w Polsce. –Pol. Pismo Entomol., tom 55:433-436
12. R.Haitlinger, 1987. The genus *Leptus* Latreille, 1796 and *Charletonia* Oudemans, 1910 (Acarina, Prostigmata, Erythraeidae) in Poland (larvae). – Pol. Pismo Entomol., tom 57:339-349
13. R.Haitlinger, 1996. Seven new larval species of mites (Acarina, Prostigmata: Erythraeidae and Trombidiidae) from Poland. Wiadomosci Parazitologiczne 42 (4):443-460
14. R.Haitlinger, 2000. Mites (Acari: Prostigmata: Erythraeidae, Trombidiidae) new to the fauna of Norway, Finland, Russia, Latvia and Lithuania, with a description of *Podothrombium roari* n.sp. –Entomologia Fennica, 13:187-193

15. R.Haitlinger, 2005. Four new species of Erythraeidae (Acari: Prostigmata) and the first records of *Charletonia braunsi* (Oudemans, 1910) and *C.brunni* (Oudemans, 1910) from Ethiopia.-*Revista iberica de Arachnologia*, vol.12, pp:79-90
16. T.Ido, M.Kumakiri, Li-Min Lao, Y.Yano and N.Takada, 2003. Dermatitis Caused by *Balaustium murorum*. –*Acta Derm Venereol* 84:80-81
17. Pereira A.I.A.; Fadini, MAM.; Pikart TG.; Zanuncio H.; Serrao,JE.,2012. New hosts and parasitism notes for the mite *Leptus* (Acari: Erythraeidae) in fragments of the Atlantik Forest, Brazil. –*Brazilian Journal of Biology*, vol.72, no 3, pp. 611-616
18. W.L.Putman, 1970. Life History and Behavior of *Balaustium putmani* (Acari: Erythraeidae).-*Annals of the Entomol. Society of America*, volum 63, pages 76-81
19. L.Salvatierra and M.Q.Almeida, 2017. First record of a *Leptus* Latreille mite (Trombidiformes, Erythraeidae) associated with a Neotropical trapdoor spider (Araneae: Mygalomorphae: Actinopodidae).-*Cogent Biology*, 3, page 1-9
20. R.V.Southcott, 1961. Studies on the systematic and biology of the Erythraeoidea (Acarina) with a critical revision of the genera and subfamilies. –*Austral. J.Zool.* v.9, №3, 367-610
21. R.V.Southcott, 1989. A larval mite (Acarina: Erythraeidae) parasiting the European honey bee in Cuatemala.-*Acarologia*, t.30, fasc. 2:123-129
22. A.Wohlmann, H.Witte, R.Olomski, 2001. Organismal pattern causing high potential for adaptive radiation in Parasitengonae (Acari: Prostigmata).-*Proceeding of the 10 th International Acarol. Congress*, Melbourn, pages 83-99
23. A. Wohlmann, 2001. Closely related species of Parasitengonae (Acari: Prostigmata) inhabiting the same areas:features facilitating coexistence.-*Proceeding of the 10 th International Acarol. Congress*, Melbourn, 2001, pages 122-135
24. Z.-Q.Zhang et al., 2011. Order Trombidiformes Reuter, 1909.-*Zootaxa* 3148:129-138

Aslanov O.X., Əlizadə G.Ə.

Eritreid Gənələri (Acariformes:Actinedida: Erythraeidae)

Məqalədə Erythraeidae Robineau-Desvoidy, 1828 fəsiləsinə aid olan gənələrinin icmalı verilir. Bu gənələrin morfolojiya, biologiya, ekologiya, praktiki əhəmiyyətindən məlumatlar verilir.

Aslanov O.Kh., Alizade G.A.

Eritreid Mites (Acariformes:Actinedida: Erythraeidae)

In paper is given review of erythreid mites. Information about morphology, biology, ecology, practical meaning this mites is presented.