

Особенности распределение кровососущих комаров в естественно-климатических районах Северного Кавказа

Гаджиева С.С.

Дагестанский государственный педагогический университет
sadaget09@mail.ru

В статье представлены результаты изучения распределения кровососущих комаров в природно-климатических районах Северного Кавказа. Определена зависимость распределения кровососущих комаров от условий среды и высоты местности. Выявлена причина бедности видового состава кровососущих комаров, которая заключается в сухости климата, низкой средней температуре, отсутствием водоемов, пригодных для развития личинок комаров.

Введение

Климатические условия Северного Кавказа характеризуются наличием резких природных контрастов. В относительно небольшой территории можно встретить и диапазон рельефов от пустынь до альпийских лугов, что и обусловило неравномерное распределение комаров на территории региона исследования [6].

Обнаружение картины распределения кровососущих комаров согласно ландшафтным и высотным поясам с количественными показателями их изобилия дает возможность в значительной степени улучшить методы проведения планомерной борьбы с кровососами.

По видовому составу и численности, кровососущие комары распределены по-разному не только в разных ландшафтных поясах, но и внутри одного и того же пояса в зависимости от высоты местности [4].

Целью данной исследовательской работы является сравнительный обзор распределения кровососущих комаров в естественно-климатических районах в связи с различным характером влияния биотических условий.

Материал и методика

Научные исследования проводились летние месяцы 2016 года. При проведении исследований особое внимание уделялось выполнению учетных работ, позволивших с высокой достоверностью судить о частоте встре-

чаемости кровососущих комаров на той или иной территории, и ландшафтно-высотному распределению популяции.

Были обследованы все легкодоступные водоемы, как в поймах, так и на водоразделах для выявления мест выплода личинок комаров. Отобраны наиболее типичные водоемы, у которых определялись глубина, грунт, растительность, температура и цвет воды [2].

Сбор личинок проводился водным сачком диаметром 15 см. Плотность заселения в большом водоеме определялся путем вылова личинок и куколок сачком диаметром 25 см. Учет в мелких и малых водоемах производился после взятия проб сачком диаметром 10 см. Облавливали полосу в 1 м, далее подсчитывался площадь биотопа в кв. м. Личинок дупляных комаров собирали с помощью сачка диаметром 4-5 см и пипетки, снабженные резиновой грушей. Для сбора личинок дупляных комаров использовался способ откачивания воды с личинками резиновым шлангом. Для этого шланг в начале заполнялся водой и один конец скреплялся зажимом, а противоположный опускался в дупло. Через 2-3 мин. личинки всплывали на поверхность воды, зажим снимался, и личинки с водой по шлангу увлекались в сосуд. Двукратным повторением этого приема удастся выбрать почти всех личинок из водоема. Если вылов проводился за 1 час до захода, во время и после захода солнца, учеты комаров давали лучшие результаты.

В пробирки с 96% спиртом помещались выловленные личинки IV возраста, туда же погружалась этикетка с указанием года, месяца, числа, места сбора, характера водоема и температуры воды, а личинки младших возрастов дорастивались до IV возраста. Постоянные препараты комариных личинок готовились по методике, предложенной в [7].

Сбор взрослых комаров проводился сразу огромным количеством пробирок-морилок (пробирки с тампонами, насыщенными хлороформом или эфиром и сверху покрытые сухими ватными тампонами), что давало возможность не тратить время на пересадку и тампонирование живых комаров.

Комары также отлавливались на стеблях травянистой растительности, выкашивая их сачком, на животных на территории сельскохозяйственных ферм и в жилых помещениях во время роения. Видовой состав объектов исследования определяли по определителю [3]

Результаты и обсуждение

Своеобразие ландшафтов заметно отражаются на фауне комаров. В дельте рек Терека, Сулака, Акташ, Шура-озень, Ярык – су, Дарвагчая, Гюлгери – чай, Манас-озень, Гамри-озень и распространены в различной степени заболоченные и засоленные почвы. Основной массив составляют болотные почвы плавней в комплексе с луговыми и лиманными солончаками. Данные почвы генетически связаны между собой, потому как заболачивание, так и засоление обусловлено высо-

ким состоянием грунтовых вод. В данных участках, где происходит массовый выплод, наиболее многочисленными представляются виды из семейства *Culicidae*: *Anopheles algeriensis*, *An. hyrcanus*, *Aedes caspius caspius*, *A. cantans*, *A. exerucians*, *A. detritus*, *Culex modestus*, *C. pipiens* [2].

В местах разливов речных и выходов грунтовых вод, плавневые почвы находятся в пониженных участках. Тут формируются иловато-болотные фитоценозы зарослей тростника (*Phragmites communis*) и рогоза (*Typha angustifolia*), в которых довольно зачастую попадаются вейник наземный, мята, авран и ряд других влаголюбивых растений. Полынь солончаковая, солончаковая астра появляются на засоленных участках. Эти места являются местами выплода *Anopheles algeriensis*, *Aedes cantans* [1].

По составу очень пестрые лиманные луга. Они включают тростниково-вейниковые, тростниково-бескильницевые и солончаковые растительности. Эти биотопы являются местами выплода *Anopheles hyrcanus*, *Aedes caspius caspius*, *Culex modestus*. Доминируют здесь *Aedes caspius caspius*, *Culex pipiens*.

Дельта реки Рубас-чай и примыкающая к ней низменность до Дербентского прохода является широкой равниной, весьма пересеченной, прорезанной устьями рек Гюльгери - чай, Дарваг- чай. Берега Гюльгери - чай, характеризуются песчаными пляжами, поверхность которых постепенно сливается с заболоченной поверхностью дельты. На некоторых участках ее встречаются и песчаные бугры высотой до 0,5-1м, часто заросшие кустарниковой растительностью, и водоемы, которые являются местами массового выплода *Anopheles hyrcanus*, *Aedes caspius caspius*, *Culex pipiens*.

В дубовых лесах, где встречаются граб, клен, липа, груша кавказская, ясень, бересклеты, доминируют виды *Anopheles plumbeus*, *Aedes geniculatus*.

Большая часть палеоэндемиков Дагестана являются нагорными ксерофитами, приуроченными главным образом к глубоким каньонам основных рек - Сулака, Самура и их многочисленных притоков. В этих ландшафтах преобладают *Aedes caspius caspius*, *Aedes pulcheritarsis pulcheritarsis*, *Culex pipiens*. Редкостным оказался *Anopheles hyrcanus* [5].

Широколиственные леса распространены в долинах, где встречаются и участки сосновых лесов. На внешних склонах хребтов растут дуб, граб, выше (600 - 1200 м. над ур. м.) встречаются бук. На высоте 1200 м и более лес переходит в горные кустарники и луга. Здесь обычны виды: *Anopheles maculipennis maculipennis*, *Aedes caspius*

caspius, *Aedes geniculatus*, *Culex apicalis* и *Culex pipiens*. Редкими видами являются *Anopheles plumbeus*, *Culex hortensis* и *Culex theileri*.

В поясе широколиственных лесов, в предгорных степях, и особенно - на низменности отмечено наибольшее количество видов кровососущих комаров. В горных степях наблюдаются обеднение видового состава и обилия кровососов.

Места выплода разнообразных групп кровососущих комаров на низменности и в высотных поясах региона исследования существенно различаются. По этой причине нами самое большое внимание обращено на водоемы различных типов:

1. Водоемы низменности. Они связаны главным образом с системой орошения: рисовые поля, оросительные каналы, многочисленные фильтрационные водоемы вдоль берегов рек и оросительных каналов. Местами выплода комаров служат большое количество водоемов и заболоченностей, которые образуются в поймах рек во время паводка.

2. Водоемы пояса предгорных степей в основном образуются грунтовыми водами. Комары выплывают в источниках, родниках с резервуарами для водопоя скота

3. Водоемы пояса широколиственных лесов весьма разнообразны: дупляные, лесные водоемы, лужи под пологом леса, водоемы родникового питания.

4. Водоемы пояса горных степей, субальпийского и альпийского поясов. У большинства кровососущих комаров площадь мест выплода сокращается выше пояса широколиственных лесов. Только лишь в участках, лишенных стока, или со слабым стоком сохраняются незначительные заболоченности и лужи от дождей – места размножения комаров.

Важность пойменных водоемов обуславливается гидрологическими условиями, в особенности сроками наступления, длительностью и высотой паводка. Необходимо отметить, что *Anopheles maculipennis*, *Culex hortensis*, *Culex pipiens* успевают выплывать в пойменных водоемах за период между паводками.

Каждый высотный пояс отличается от иного не только лишь количеством видов кровососов, но и их комплексами. В таком случае каждый пояс населен определенными группами кровососущих комаров. В зависимости от широты распределения мест выплода, природно-климатических условий и высоты над уровнем моря можно выделить следующие группировки видов:

В первую группу входят виды кровососущих комаров, которые распространены на низменности (от 26 - 200 м над ур. м.): *Anopheles*

algeriensis, *An. maculipennis sacharovi*, *An. superpictus*, *An. hyrcanus*, *An. plumbeus*, *Aedes detritus*, *A. excrucians*, *A. cantans*, *A. vexans*, *A. Flavescens*, *A. cinereus*, *Culex modestus*. Данные виды комаров характерны для непроточных или слабопроточных водоемов. Количество видов комаров здесь значительно выше, чем в других ландшафтных поясах исследуемого региона, в связи с разнообразием физико-географических условий по сравнению с другими ландшафтными поясами. Многочисленными разнообразными водоемами с богатой водной растительностью различных групп и влажным климатом характеризуется приморская часть низменности. Необходимо выделить, то, что в условиях низменности больше всего комаров выплывает во временных водоемах в глубине леса (150-200 личинок на 1 кв. м) и в водоемах на лугу (до 100-150 личинок на 1 кв.м). Фауна комаров рода *Anopheles* составляет почти 85% найденных нами в исследуемой местности (рис.1).




Рис 1. Соотношение числа видов кровососущих комаров в ландшафтных поясах (в процентах к общему числу видов).

Вторую группу составляют виды кровососущих комаров, приуроченных к низменности и к предгорьям (предгорные степи, широколиственные леса - 26 - 1000 м над ур. м.): *Anopheles maculipennis*, *An. hyrcanus*, *An. plumbeus*, *Aedes caspius caspius*, *A. pulchritarsis pulchritarsis*, *A. communis*, *A. geniculatus*, *Culex apicalis*, *C. hortensis*. Кроме вышеуказанных видов, в наиболее возвышенных районах низменности, ближе к предгорьям, где размещаются плантации риса, встречаются и некоторые другие виды комаров, свойственные низменной части исследуемой местности.

Третья группа представлена видами кровососущих комаров, распространенных преимущественно в нижних горных поясах (200 - 2000 м. над ур. м.), где расположены предгорные степи, широколиственные леса, горные степи - *Anopheles plumbeus*, *An. maculipennis maculipennis*, *Aedes pulchritarsis*, *Culex pipiens pipiens*, *C. mimeticus*. Данная зона исследуемой местности в основном характеризуется незначительным количеством водоемов, пригодных для заселения личинок комаров и скудностью гидрофитной растительности. Тут долины всех речек узкие, глубокие. Главным источником продуцирования комаров в данной части считаются водоемы родникового питания, прирусловые лужи маленьких рек и копанки. В силу этого комары здесь в видовом отношении небогатые и существенно малочисленнее, нежели в иных частях исследуемой территории.

В четвертую группу входят виды кровососущих комаров, встречающихся в основном в высших поясах гор (горных степей, субальпийский, альпийский - от 1000м над ур. м. и выше): *Anopheles maculipennis*, *An. bifurcates*, *An. superpictus*, *Culex hortensis*, *C. pipiens pipiens*, *C. theileri*. Наиболее развита речная сеть в этой части изучаемой территории. В различных ярусах горных хребтов встречаются более или менее глубокие плоские котловины, и где речки образуют большое число изолированных водоемов. Личинки различных видов кровососущих комаров выявлены в них и в водоемах родникового питания,

Пятую группу составляют виды кровососущих комаров, обладающих большой экологической пластичностью, распространенных от низменности до альпийского пояса (26 – 2500 м над ур. м.): *Anopheles maculipennis*, *Anopheles bifurcates*, *Anopheles superpictus*, *Culex pipiens pipiens*, *Culex theileri*, *Culex hortensis*. Сравнительным маловодьем и скудностью водной растительности характеризуется в основном эта часть территории. И в видовом отношении, и по численности особей комары на высотах, превышающих 1800-2000 м относительно бедны. В этих местах исследуемой территории за период исследовательской работы были найдены только личинки *Culex hortensis* и *Culex pipiens pipiens*. Основной причиной бедности видового состава комаров и их малочисленности является низкие средние температуры, и в первую очередь, отсутствием водоемов, пригодных для развития личинок комаров.

Заключение

Анализ фауны кровососущих комаров, собранных в различных экологических районах, позволили установить, что они распределены

неравномерно. Неравномерность распределение кровососущих комаров зависит от высоты местности и условий среды обитания.

Полученные данные позволят провести своевременную и планомерную работу по борьбе с кровососущими комарами.

Список литературы

1. Гаджиева С.С. 2008. Влияние гидрологического режима на распределение преимагинальных фаз кровососущих комаров по биотопам в условиях Низменного Дагестана /С.С. Гаджиева //Естественные и технические науки. №2. - С. 82 -87.
2. Гаджиева С.С. 2006. Распределение преимагинальных фаз кровососущих комаров по биотопам с гидрологической характеристикой водоемов и их зарастанием в условиях Дагестана. Известия высших учебных заведений. Северо-кавказский регион. Естественные науки. - Ростов-на Дону, РГЮУ, № 10. - С. 47-53.
3. Гуцевич А.В., Мончадский А.С., Штакельберг А.А. 1970. Фауна СССР. Насекомые двукрылые. Т.3, вып.4. Л.: Наука, 384 с.
4. Исмаилов Ш.И. 1996. Состав и закономерности распределения фауны кровососущих двукрылых насекомых восточной части Большого Кавказа. Дисс. докт. биол. наук. Санкт-Петербург, 336 с.
5. Исмаилов Ш.И. 1995. Компьютерный банк данных DIPKAV и картографическая система ZOOMAP для анализа состава и закономерностей распределения кровососущих двукрылых насекомых (Insecta, Diptera) северо-восточной части Большого Кавказа /Ш.И. Исмаилов, А.Л. Лобанов //Новый подход к проблеме объективного зоогеографического районирования. Махачкала. - С. 87 - 150.
6. Касымов А.Г. 1987. Физическая география Дагестана. Махачкала - С. 15-27.
7. Мончадский А.С. 1951. Личинки кровососущих комаров СССР и сопредельных стран (подсем. Culicinae) // Определители по фауне СССР. М.-Л., № 7. 290 с.

Abstract**Peculiarities of Distribution of Blood-Consecrating Commercials
in Natural-Climatic Areas of the North Caucasus****Gadzhieva Sadaget Sultanvagidovna**

The article presents the results of studying the distribution of blood-sucking mosquitoes in the natural and climatic regions of the North Caucasus. The dependence of the distribution of blood-sucking mosquitoes on the conditions of the environment and the height of the terrain is determined. The cause of the poverty of the species composition of bloodsucking mosquitoes is revealed, which consists in the dryness of the climate, low average temperature, the absence of water bodies suitable for the development of mosquito larvae.