

УДК 612.825.5. 591.35

Влияние гипоксии на электрическую активность мозга крольчат разного возраста

Гусейнов А. Г.

Институт физиологии им. А.И. Караева НАН Азербайджана

По мере развития в онтогенезе, картина влияния кислородного голодания в разные периоды эмбриогенеза на суммарную активность слуховой коры крольчат изменяется. В ранние периоды онтогенеза электрическая активность коры мозга по сравнению с зародышевым периодом более сильно и почти одинаково реагирует на гипоксию в предплодный и плодный периоды внутриутробной жизни. У взрослых более сильное воздействие на суммарную активность коры мозга оказывает кислородная недостаточность в плодный период, а наименьшее – в зародышевый период пренатального онтогенеза.

Введение

Известно, что чувствительность нервной системы и ее отдельных структур в течение раннего онтогенеза изменяется. В последние годы электрофизиологические исследования выявили, что нервная система мозга неоднозначно реагирует на кислородное голодание в разные периоды внутриутробной жизни и по мере развития в онтогенезе эта реакция изменяется [1,2,4]. Однако, закономерности и механизмы этих изменений не выяснены. С этой целью, в настоящей работе исследовано изменение в течение раннего онтогенеза картины влияния кислородного голодания в разные периоды эмбриогенеза на суммарную активность коры мозга.

Материал и методика

Исследования проводились на 28-и дневных плодах кролика и 10-, 20-и и 30-и дневных крольчат породы Шиншилла. Всего было использовано 197 животных. Во всех возрастных группах крольчата подвергались гипоксии в разные периоды внутриутробной жизни; одна группа в течение всего зародышевого периода (с 1-го по 8-е сутки), вторая – в течении предплодного периода (с 8-го по 18-е сутки), а третья – в течении плодного периода (с 18-го по 28-е сутки) эмбриогенеза. Для создания гипоксического состояния у плодов и крольчат, беременная крольчиха каждый день помещалась в прозрачную, специальную вентилируемую камеру объемом 0,12 м³, куда в течение

20–и мин подавалась смесь газов – кислорода (5%) и азота (95%).

Перед регистрацией электрической активности коры мозга, животные наркотизировали внутривенным введением раствора этаминала–натрия в дозе 40 мг/кг. Электрокортикограмму (ЭКоГ) регистрировали с поверхности слуховой коры. ЭКоГ регистрировали с помощью игольчатых электродов, референтный электрод фиксировали в носовой пазухе плода. ЭКоГ записывали на 8–и канальном электроэнцефалографе «Медикор» и на компьютере «Нейрон Спектр 2». Фильтры усилителя электроэнцефалографа устанавливались в диапазоне 0,1–70 Гц. Регистрация с каждой области продолжалась в течение 20–и мин.

С помощью компьютера «Нейрон Спектр 2» проведен спектральный анализ ЭКоГ, исследованы стандартные волны δ –, θ –, α – β_1 – и β_2 –диапазона. Эпохи анализа для каждого животного составляла 30 с. Полученные данные подвергнуты статистической обработке с помощью пакета программ Excel. Достоверность данных определялась по критерию t Стьюдента.

Результаты и их обсуждение

Исследования показывают, что ЭКоГ контрольных крольчат всех возрастных групп отличается высоким содержанием медленных волн, занимающие четверть спектра. В медленном спектре доминируют θ –волны. Быстрая β –активность занимает больше половины всего спектра. При этом, выраженность β_1 –волн в два раза больше, чем β_2 –волн. Доминирующие быстрые волны суммарной активности коры мозга накладываются на более медленные волны, и тем самым их маскируют. Во всех возрастных группах влияние гипоксии на спектральный состав суммарной активности коры мозга в основном заключается в усилении выраженности медленных волн.

Исследования, проведенные на 28–и дневных плодов кролика, показывает, что если кислородная недостаточность в зародышевый период эмбриогенеза почти не влияет на электрическую активность коры мозга, то в последующие периоды она вызывает более заметные, и почти одинаковые изменения в спектре. На основании большей изменчивости θ – и α –активности спектра можно считать, что кислородное голодание в предплодный период внутриутробной жизни, по сравнению плодным в ЭКоГ вызывает больше изменений (рис. 1 и диаг. 1).

У 10–и дневных крольчат после кислородного голодания в течение предплодного и плодного периодов эмбриогенеза, по сравнению




Рис.1. ЭКоГ слуховой коры 28-и дневных плодов кролика: контрольных (а), после гипоксии, перенесенной в зародышевый (b), предплодный (с) и плодный (d) периоды эмбриогенеза. 100 мВ, 1 с.




Диаграмма 1. Спектральный состав ЭКоГ слуховой коры 28-и дневных плодов кролика: контрольных (а), после гипоксии, перенесенной в зародышевый (b), предплодный (с) и плодный (d) период эмбриогенеза (* – $p < 0,5$, ** – $p < 0,01$, * – $p < 0,001$).**

с зародышевым периодом в спектральном составе ЭКоГ обнаружены более значительные изменения. При этом, сила и характер их воздействия на спектр суммарной активности почти одинаковы. В обоих случаях усиление выраженности медленных волн суммарной активности происходит за счет δ -активности, которая становится преобладающим в медленном спектре. Под влиянием гипоксии подавляются α - и β_2 -активность, удельный вес β_1 -волн незначительно увеличивается. Однако, гипоксия, проведенная в плодный период эмбриогенеза оказывает на спектральные индексы δ -, θ -, и β_2 -активности более заметное влияние (рис. 2 и диаг. 2).




Рис.2. ЭКоГ слуховой коры 10-и дневных крольчат: контрольных (а), после гипоксии, перенесенной в зародышевый (b), предплодный период (с) и плодный (d) периоды эмбриогенеза. 100 мкВ, 1 с.




Диаграмма 2. Спектральный состав ЭКоГ слуховой коры 10-и дневных крольчат: контрольных (а), после гипоксии, перенесенной в зародышевый (б), предплодный (с) и плодный (д) периоды эмбриогенеза (* – $p < 0,5$, ** – $p < 0,01$, *** – $p < 0,001$).

На 20-й день постнатальной жизни меньше всего изменений в спектральном составе суммарной активности обнаружены после гипоксии, перенесенной в зародышевый период эмбриогенеза. Под влиянием дефицита кислорода, в течение предплодного и плодного периодов внутриутробной жизни, в спектре ЭКоГ обнаруживаются почти одинаковые изменения. Различия заключается в том, что кислородное голодание в предплодный период пренатального онтогенеза несколько больше влияет на показатели $\beta 2$ -активности спектра (рис. 3 и диаг. 3).

У 30-и дневных крольчат дефицит кислорода в плодный период внутриутробной жизни более сильно влияет на спектр суммарной активности коры мозга, чем в предплодный период. Если при кислородном голодании в предплодный период эмбриогенеза увеличение медленного спектра ЭКоГ происходит в основном за счет δ -волн, то в плодный период усиливается как δ -, так и θ -активность. В последнем случае также подавляется также $\beta 2$ -активность. Минимальные изменения в электрической активности слуховой коры обнаружены после гипоксии, проведенной в зародышевый период эмбриональной жизни (рис. 4 и диаг. 4).

Во всех возрастных группах усиление выраженности медленных волн спектра под влиянием гипоксии отражается в общей картине ЭКоГ. С уменьшением количества быстрых волн, в основном накладывающихся на более медленные волны, последние и ритмическая активность приобретают более отчетливые очертания.




Рис.3. ЭКоГ слуховой коры 20–и дневных крольчат : у контрольных (а), после гипоксии, перенесенной в зародышевый (b), предплодный (с) и плодный (d) периоды эмбриогенеза. 100 мкВ, 1 с.




Диаграмма 3. Спектральный состав ЭКоГ слуховой коры 20–и дневных крольчат: контрольных (а), после гипоксии, перенесенной в зародышевый (b), предплодный (с) и плодный (d) период эмбриогенеза (* – $p < 0,5$, ** – $p < 0,01$, *** – $p < 0,001$).




Рис 4. ЭКоГ слуховой коры 30-и дневных крольчат : у контрольных (а), после гипоксии, перенесенной в зародышевый (б), предплодный (с) и плодный (д) периоды эмбриогенеза. 100 мкВ, 1 с.




Диаграмма 4. Спектральный состав ЭКоГ слуховой коры 30-и дневных крольчат: контрольных (а), после гипоксии, перенесенной в зародышевый (б), предплодный (с) и плодный (д) периоды эмбриогенеза (* – $p < 0,5$, ** – $p < 0,01$, *** – $p < 0,001$).

Обобщая полученные данные, можно заключить, что электрическая активность слуховой коры крольчат неоднозначно реагирует на кислородное голодание в разные периоды внутриутробной жизни и по мере развития в онтогенезе эта реакция электрической активности слуховой коры мере развития в онтогенезе эта реакция изменяется. Во всех возрастных группах минимальное воздействие гипоксии обнаруживается при гипоксии в зародышевый период эмбриональной жизни. У 28-и дневных плодов, 10-и 20-и дневных крольчат, кислородная недостаточность в последние два периода эмбриогенеза, почти одинаково влияет на показатели ЭКоГ слуховой коры. Только в результате детального анализа можно утверждать, что у 28-и дневных плодов и 20-и дневных крольчат более заметные изменения в ЭКоГ наступает при дефиците кислорода в предплодный период, у 10-и дневных животных в плодный период пренатального онтогенеза. В следующей возрастной группе, у 30-и дневных крольчат, в период, когда почти заканчивается развитие нервной системы, максимальные изменения в спектральном составе ЭКоГ обнаруживаются после гипоксия, проводимой в плодный период эмбриогенеза. С возрастом кислородное голодание во всех периодах пренатального онтогенеза более интенсивно влияет на электрическую активность коры мозга.

Одной из основных причин неоднозначной реакции электрической активности коры мозга на кислородное голодание в разные периоды внутриутробной жизни является изменение в течение указанного периода чувствительности нервной системы и ее отдельных структур к гипоксии изменяется [2, 5, 7, 8, 9].

Относительно ранние периоды эмбриогенеза подкорковое белое вещество (5) и кора мозга проявляют высокую чувствительность к нехватке кислорода (3). Если к концу эмбриогенеза эти структуры приобретают устойчивость к кислородному голоданию [3, 5], то серое вещество подкорковых структур, наоборот, в связи с усилением их функциональной активности становится чувствительным к ее действию [6].

В течение внутриутробной жизни изменяется также реакция эмбриона на недостаток кислорода. Относительную устойчивость нервных структур к дефициту кислорода в течение зародышевого периода пренатальной жизни можно связать с малыми потребностями к кислороду эмбриона [7].

У кролика предплодный период эмбриональной жизни по времени совпадает с интенсивными процессами органогенеза [6]. Нарушение этих процессов под воздействием гипоксии, несомненно,

отражаются в структурах нервной системы. Указанный период кора мозга и подкорковое белое вещество проявляют высокую чувствительность к нехватке кислорода [3,8]. Можно предположить, что эти изменения являются основными причинами сильного изменения ЭКоГ под влиянием гипоксии, в течение предплодного периода.

Предположительно низкая устойчивость подкоркового белого вещества к гипоксии в поздние периоды эмбриогенеза (6) является основной причиной сильного изменения спектра ЭКоГ под воздействием кислородного голодания в плодный период пренатальной жизни,

Несомненно, изменение с возрастом реакции ЭКоГ, на кислородное голодание в разные периоды эмбриогенеза жизни связано с отсроченными структурными изменениями в нервной системе. Известно, что в нервной системе структурные нарушения могут появляться сразу или же позднее, через несколько дней, или же недель после ее воздействия гипоксии [3,8].

Литература

1. Abdulkərimova S.L., Məmmədov X.B., Hüseynov Ə.H. Prenatal hipoksiyanın 20 günlük dovşan balalarında baş beyin görmə qabığının funksional inkişafına təsiri Fiziologiyanın və biokimyayın problemləri. Bakı, 2008, s. 1–10.
2. Hüseynov Ə.H., Məmmədov X.B. Ontogenezin müxtəlif dövrlərində aparılan hipoksiyanın dovşan dollərinin beyin qabığının yekun aktivliyinə təsiri Fizioloqiyanın və biokimyayın problemləri. Bakı, 2016, c. XXXIV.S. 66–70.
3. Васильев Д. С., Туманова Н.Л., Журавин И.А. Структурные изменения в нервной ткани новой коры в онтогенезе крыс после гипоксии на разных сроках эмбриогенеза. Ж. эволюц. биохимии и физиол. 2008, т. 44, № 3, с. 258–267.
4. Гусейнов А. Г., Мамедов Х.Б. Влияние гипоксии в разные периоды пренатального онтогенеза на электрокортикограмму плодов кролика Российский физиологический журнал им. И.М.Сеченова. 2012, т. 98, № 10, с. 1250–1257.
5. Дыбан А.П., Пучков В.Ф., Баранов В.С., и др. Лабораторные млекопитающие: мышь, крыса, кролик, хомячок. В кн.: Проблемы биологии развития. Объекты биологии развития. М., Наука, 1975, с.505–566.
6. Johnston M. V. Hypoxic and ischemic disorders of infants and children. Brain Dev. 1997. v. 19, p. 235–239.
7. Kawai S., Yonetani M., Nakamura H., Orada Y. Effects of deprivation of oxygen and glucose on the neural activity and the level of high energy phosphates in the hippocampal slices of immature and adult rat. Dev. Brain res., 1989, v. 48, p. 11–18.
8. Tanaka H., Amamiya S., Takahashi S., Suzuki N., Araki A., Ohinata J., Fujieda K. Effect of neonatal hypoxia on the development of intraspinal serotonergic

fibers in relation to spinal motoneurons. Brain and Development. 2010, v. 32. p. 268–274.

Prenatal hipoksiyanın müxtəlif yaşlı dovşan balalarının beyninin elektrik aktivliyinə təsiri

Ontogenezdə inkişafda əlaqədar embriogenezin müxtəlif dövrlərində oksigen aclığının dovşan balalarının eşitmə qabığının yekun aktivliyinə təsiri dəyişir. Ontogenezin ilkin dövrlərində beyin qabığının elektrik aktivliyi bətdaxili həyatın dölünü və döl dövrlərində hipoksiyaya daha güclü və demək olar ki, eynü dərəcədə cavab verir. Yetkin heyvanlarda beyin qabığının yekun aktivliyinə ən çox prenatal ontogenezin döl dövründə, ən az isə rüşeyim dövründə oksigen çatmamazlığı təsir göstərir.

Impact of prenatal hypoxia on electric activity of the brain of the rabbit pups of different age

In the course of embryogenesis character of impact of oxygen deficiency on general electric activity of the acoustic cortex of the rabbit pups differs. In pre-fetal and fetal periods of prenatal ontogenesis electric activity of the brain cortex react to hypoxia stronger and in almost similar manner relatively to the embryonic period. In postnatal ontogenesis the most profound changes are induced by oxygen deficiency in fetal period, whereas the least effect is realized by oxygen deficiency in embryonic period.